Knowledge grows

QUALITAETSPROGRAMM OBSTBAU: APFEL

Entwicklungs-stadien	EMPFELUNGEN
 ***Ballonstadium***	**Foerderung des Startwachstums** 20 L/ha **YaraVita MAGPHOS** + 2 L/ha **YaraAmplix OPTINUE (Fertigation oder Brause (bei Eisenchlorose YaraVita FERRICHEL 100/REXOLIN Q48)** 1 L/ha **YaraVita BORTRAC 100 FL** + 0.25-0.5 L/ha **YaraVita ZINTRAC 700** + 0.5 L/ha **YaraVita MANTRAC PRO** + 2-3 L/ha **YaraVita LAST N** mittels Blatthandlung oder **YaraAmplix OPTIVI 1-2 L/ha**
 ***Beginn Blüte***	**BLATTBEHANDLUNGEN** 1 L/ha **YaraVita BORTRAC 100 FL** + 1-2 L/ha **YaraAmplix OPTIVI**
 ***Blüte***	**BLÜTENAUSDÜNNUNG** **YaraVita AZOS 300 1.2-1.5 L/hl**
 ***Blütenabgang***	**BLATTBEHANDLUNGEN** 0.5 L/ha **YaraVita MANTRAC PRO** + 2 L/ha **YaraVita HYDROMAG 500**
 ***Fruchtansatz***  ***Fruchtentwicklung***	0.5 L/ha **YaraVita MANTRAC PRO** + 2 L/ha **YaraVita HYDROMAG 500** 1-2 L/ha **YaraAmplix OPTIMARIS** + 7 L/ha **YaraVita SENIPHOS** oder 3 L/ha **YaraVita FRUTREL** 2-3 Behandlungen zur Förderung der Fruchtgröße und der Fruchtfleischfestigkeit sowie der Fruchtgröße **2-3 L/ha YaraVita CALTRAC 560 PLUS oder 4-6 L/ha YaraVita STOPIT 4 bis 8 mal im Abstand von 10-14 Tager zur Stippebekämpfung** **(Bei Problemen mit Blattfal Zusats von 2 L/ha YaraVita HYDROMAG 500)** Wichtig ist es, die letzte Behandlung möglichst kurz vor der Ernte durchzuführen bei Auftreten von Eisenchlorose 3 kg/ha **YaraVita FERRICHEL 100** + 1 L/ha **YaraVita MANTRAC PRO** **Bei Sorten mit erhöhter Anfälligkeit für Schalenrisse und Fruchtaufplatzen** **YaraAmplix ACTISIL 0.5-1 L/ha** (2 bis 4 mal im Abstand von 10-14 Tager)
 ***Ernte***	**Bei Sorten mit erhöhter Anfälligkeit für Schalenrisse und Fruchtaufplatzen** **YaraAmplix ACTISIL 0.5-1 L/ha** Zur Intensivierung der Rotfärbung: 0.5 L/hl **YaraVita SENIPHOS** + 2-3 kg/ha **YaraVita FERRICHEL 100** 3 Behandlungen, beginnend wenn sich die ersten roten Farbstreifen zeigen Zur Intensivierung der grünen Grundfarbe Granny Smith: **YaraVita MANTRAC PRO** 0.25 L/ha 6 Behandlungen bis 4 Wochen von der Ernte
Post-Ernte	2 L/ha **YaraVita BORTRAC 100 FL +** 0,5-1 L/ha **YaraVita ZINTRAC 700**

Diese Informationen dienen nur als Hinweis und ersetzen nicht die Hinweise auf der Etikette, Weiche vor der Anwendung genau zu beachten sind. Sie stellen weder einen Rechtsanspruch noch eine Haftungsgarantie dar.